

EFIENT®

Prasugrel

Présentation et caractéristiques

Efient® est un antiagrégant plaquettaire. Il a pour rôle d'empêcher la formation de caillots, de thrombose dans les artères (= vaisseaux bouchés).

Présentation : Efient® 10 mg (boîte de 30 comprimés pelliculés beiges).

A conserver à température ambiante.

Posologie et mode d'administration

La posologie usuelle est de **10 mg une fois par jour, en une prise quotidienne, au même moment de la journée, au cours ou en dehors de repas.**

Chez les patients de plus de 75 ans ou de moins de 60 kg la posologie est de 5 mg par jour.

Efient® est pris en **association avec de l'Acide acétyl salicylique = Kardegic®** (dose pouvant aller de 75 à 325 mg par jour selon la prescription médicale).

- **En cas d'oubli**, prenez le comprimé dès que vous vous en rendez compte. Si vous oubliez de prendre votre comprimé pendant une journée entière, prenez simplement votre comprimé habituel le lendemain. Ne prenez pas de double dose dans la même journée.

Principaux effets indésirables

Le principal effet est lié à son mécanisme d'action : une fluidification trop importante du sang conduit au **risque hémorragique = risque de saignement**.

Ce risque peut arriver en cas de **traumatisme, d'acte chirurgical** (par exemple soin dentaire), ou avec la **prise d'un nouveau médicament**.

- ✓ **Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**
- ✓ **Consultez votre médecin en cas de saignement anormal (par sa localisation ou sa durée)**

Effet indésirable	Prévention	Conduite à tenir
Risque de saignement, hématome, hémorragie	Utiliser une brosse à dent souple. Ne pas prendre de médicament en automédication . Si vous avez déjà eu un ulcère digestif, prévenez votre médecin.	En cas de saignement, prévenir votre médecin.
Diminution des globules blancs	Limiter les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie.	Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires.
Réaction d'hypersensibilité	En cas d'antécédent d'allergie avec un traitement par	Si apparition d'urticaire ou d'asthme au cours du

	clopidogrel (Plavix®), le risque d'hypersensibilité est augmenté avec Prasugrel (Efient®) prévenez votre médecin.	traitement par Efient®, prévenez immédiatement votre médecin.
--	---	---

La liste complète des effets indésirables est consultable sur la notice du médicament.

NB : Efient® contient du lactose. Les patients intolérants doivent le notifier à leur médecin.

Médicaments pouvant provoquer des effets indésirables ou diminuer l'efficacité de l'EFIENT®

Médicaments	Risque	Conduite à tenir
Anti-inflammatoires (Advil®, Ibuprofène, Spedifen®...) Antiocoagulants oraux (Coumadine®, Previscan®, Sintrom®, Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®)	Augmente le risque hémorragique.	Demandez conseil à votre pharmacien.

Efient®, grossesse et allaitement

Informez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être. Efient® ne doit être utilisé pendant la grossesse que si le bénéfice potentiel pour la mère justifie le risque potentiel pour le fœtus.

Conseils à suivre



Les comprimés sont à prendre en **une prise quotidienne, à heure fixe**, pendant ou en dehors des repas.

Les comprimés doivent être avalés tels quels, **sans les écraser ni les couper**.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Prenez l'avis de votre médecin avant toute prise d'un nouveau médicament (même les médicaments ne nécessitant pas d'ordonnance).



Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Ne prenez jamais l'initiative seul.



Avant tout acte chirurgical ou prise d'un nouveau médicament, signalez à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, dentiste, pharmacien, infirmier, sage-femme) que vous prenez un traitement antiagrégant plaquettaire.



Ne pas laisser à la portée des enfants.



Contactez rapidement votre médecin en cas d'apparition de selles noires, de saignements de nez, des gencives, d'hématomes importants.